

Příbalový leták Apiguard

APIGUARD gel (25% thymol) pro podání ve včelím úlu

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

výrobce

LALEHAM HEALTHCARE, SYCAMORE PARK - MILL LANE, ALTON,
HAMPSHIRE GU34 2PR, UK.

držitel registračního rozhodnutí

VITA (EUROPE) LIMITED, 21/23 WOTE STREET, BASINGSTOKE,
HAMPSHIRE RG21 7NE, UK.

složení - (zpravidla) účinné látky

Tymolum 12,5 g.

indikace nebo použití (parafarm.)

Cílový druh zvířat: Včela medonosná (*Apis mellifera*).

Léčba varroózy způsobené roztočem *Varroa destructor*.

kontraindikace

Nejsou známy.

nežádoucí účinky

Během léčby může dojít k mírnému neklidu včelstva.

Při vysokých teplotách může sporadicky během léčby dojít k mírnému snížení počtu mladého plodu; jedná se však o přechodný jev, který nemá žádný vliv na vývoj včelstva.

upozornění

Je nutné dbát na to, aby bylo zajištěno dodržení doporučeného dávkování, neboť nesprávné dávkování by mohlo mít škodlivý účinek na včelstvo.

Aplikaci neprovádějte během snůšky, aby bylo zabráněno možnému nepříznivému ovlivnění chuti medu.

Přípravek nepoužívejte, jestliže je očekávaná maximální denní teplota během aplikace přípravku nižší než 15 st. C nebo pokud je aktivita včelstva velmi nízká nebo pokud teplota přesahuje 40 st. C.

Podání vyšší dávky, než je doporučeno (50 g gelu na aplikaci odpovídající 12,5

g tymolu), by mohlo způsobit poruchy chování včelstva (neklid, unikání či zvýšení úhyn včelstva). V případě předávkování odstraňte nadměrné množství přípravku z včelstva.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V důsledku možného výskytu kontaktní dermatitidy a podráždění kůže a očí je nutné se vyhnout přímému kontaktu kůže a očí s přípravkem.

Při nakládání s přípravkem používejte společně s běžnými ochrannými prostředky i nepropustné rukavice.

V případě zasažení kůže postiženou oblast umyjte důkladně mýdlem a vodou.

Při zasažení očí vypláchněte oči důkladně velkým množstvím čisté tekoucí vody, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu praktickému lékaři.

Po ukončení aplikace přípravku si umyjte ruce mýdlem a vodou. Materiál, který byl v kontaktu s gelem omyjte vodou.

dávkování

Pro aplikaci do včelího úlu: dvě aplikace 50 g gelu na včelstvo každé dva týdny. Maximálně dvě aplikace ročně.

způsob použití

Způsob podání:

Otevřete úl. Odstraňte ochrannou fólii misky, ale ponechte jeden konec fólie přilepený k misce. Misku umístěte doprostřed na plodové rámký tak, aby byl gel nahoře. Ujistěte se, že je mezi horní částí misky a krycí deskou úlu prostor o rozměru alespoň 0,5 cm. Zavřete úl. Po dvou týdnech vyměňte první misku za novou a řiďte se stejnými pokyny. Ponechte přípravek ve včelstvu, dokud nebude miska prázdná. Při nasazování medníků do včelstev přípravek vyjměte.

Účinnost přípravku se zvýší, jestliže se přípravek použije koncem léta po ukončení snůšky (když dochází k poklesu počtu přítomného včelího plodu). V případě silného zamoření může být však přípravek použit také na jaře, při teplotách nad 15 st. C.

Účinnost přípravku se může u jednotlivých včelstev lišit v závislosti na charakteru aplikace. Apiguard by měl být proto použit v kombinaci s jinými přípravky v rámci ochranných a zdolávacích opatření a je nutné pravidelně sledovat spad roztočů. Jestliže v průběhu následující zimy nebo jara byl zaznamenán další významný nárůst spadu roztočů, doporučuje se během zimy nebo jara provést ještě další jiná ošetření proti varroáze.

upozornění (příbalový leták)

Přípravek lze aplikovat ihned po vyjmutí medníků.
Před aplikací přípravku sdružte slabá včelstva.
Všechna včelstva by měla být ošetřena současně.

uchovávání (příbalový leták)

Neuchovávejte při teplotě nad 30 st. C.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním neotevřeném balení.

Chraňte před přímým sluncem.

Přípravek neuchovávejte v blízkosti pesticidů nebo jiných chemických látek, které by mohly přípravek kontaminovat.

Uchovávejte odděleně od potravin.

varování (příbalový leták)

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Všechnen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

balení (příbalový leták)

10 misek 50 g gelu.

ochranná lhůta veter.

Med: 0 dní.

Nepoužívejte během období snůšky medu.